


DYNAMIC CRESCO

DYNAMIT W KORZENIU!



**PŁYNNY NAWÓZ MIKROELEMENTOWY
ZAWIERA AOC – PREKURSOR FITOHORMONÓW
KORZYSTNYCH DLA WZROSTU ROŚLIN**

- > skuteczny od bardzo wczesnych faz rozwojowych
- > efektywny w niewielkiej dawce
- > łatwy w stosowaniu
- > kompatybilny z większością agrochemikaliów




W jaki sposób DYNAMIC CRESCO wpływa na plon?

- Poprawia zdolność pobierania i akumulowania składników pokarmowych
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
- Zwiększa współczynnik wykorzystania azotu
- Ogranicza skutki stresu
- Poprawia mrozoodporność
- Eliminuje negatywne efekty nierównych wschodów


KUKURYDZA NA KISZONKĘ

Plon zielonej masy kukurydzy Farmik, IUNG Puławy, 2016




KUKURYDZA NA ZIARNO

Plonu ziarna (wilgotność 30%) kukurydzy LG 32.16, badania własne Budziejewo 2016




PSZENICA OZIMA

Plonu ziarna Linus, badania własne Budziejewo 2016



RZEPAK OZIMY

Plon nasion rzepaku ozimego, UTP Bydgoszcz 2012



Potwierdzona skuteczność



RZEPAK OZIMY

Zalecany termin:
jesienią: w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych
wiosną: po ruszeniu wegetacji
Zalecana dawka: 0,8 l/ha

RZEPAK JARY

Zalecany termin: w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych
Zalecana dawka: 0,8 l/ha



ZBOŻA OZIME I JARE

Zalecany termin: od fazy piórkowania do końca krzewienia
Zalecana dawka: 0,8 l/ha



KUKURYDZA

Zalecany termin: w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych
Zalecana dawka: 0,8-1,2 l/ha



ZIEMNIAKI

Zalecany termin: fazy od dwóch liści właściwych do momentu przed zawiązaniem bulw
Zalecana dawka: 0,8-1,2 l/ha



TRAWA

Zalecany termin: Stosować w fazie od dwóch liści do początku krzewienia
Zalecana dawka: 0,8 l/ha



TRUSKAWA

Zalecany termin: wiosną na początku wegetacji
Zalecana dawka: 0,8-1,2 l/ha

Zalecana ilość wody:
uprawy polowe: 100-200 l/ha
uprawy specjalistyczne: 200-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste